

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE
CPPAP N° 523 AD

DLP 29-4-77415483

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX
Tél. (88) 61.49.50 Poste 454

ABONNEMENT ANNUEL 50 F

Régisseur de recettes D.D.A.
2, rue des Mineurs
67070 STRASBOURG CEDEX
C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Bulletin n° 120

21 avril 1977

GRANDES CULTURES

- HOUBLON -

OTHIORRHYNQUE (Charançon de la Livèche)

La présence de ce ravageur a été observée lors de la taille dans un certain nombre de houblonnières, notamment à OHLUNGEN (67). Nous précisons que les dégâts causés par ce charançon peuvent se poursuivre actuellement. Compte tenu du froid qui a sévi pendant les deux premières décades d'avril et qui a fortement limité la croissance du houblon, il est bon d'éviter toute autre cause de retard. En effet, ce charançon, en coupant le bourgeon terminal de la jeune liane, peut encore accentuer son retard végétatif, le développement ultérieur de la liane se faisant à partir d'un bourgeon axillaire.

Surveiller les cultures et intervenir en cas de nécessité avec l'un des produits préconisés dans notre bulletin n° 117 du 24 mars 1977.

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

- POMMIER - POIRIER -

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Depuis le dernier traitement, les contaminations primaires qui auraient pu se produire ont été négligeables, voire nulles, en raison des conditions climatiques défavorables. La végétation reste lente et présente une forte irrégularité d'une région à une autre. A ces stades végétatifs (E 2 - F - F 2 selon les vergers), les jeunes feuilles sont très réceptives.

Les projections d'ascospores deviennent plus importantes. Des contaminations sont donc à attendre en raison du relèvement des températures (bien que relatives jusqu'à présent) et du passage d'une zone perturbée. Le renouvellement du traitement est conseillé. Il devrait être réalisé avant le 26 avril.

OIDIUM DU POMMIER

Renouveler également la protection contre l'oïdium (traitement mixte).

ARAIGNEES ROUGES

L'éclosion des oeufs d'hiver est toujours très lente. Il est encore trop tôt pour intervenir dans les vergers qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement de pré-débourrement efficace.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER